

ピクサム-G プロセスガイド

コンサルテーション

- お客様の要望を聞き、毛髪診断した後、使用薬剤・テクニックを決定します。
- ご使用前には毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。

薬剤の調合

- 1剤と2剤の基本的な混合比

| | 使用オキシジェンタ | 混合比 |
|------------|-----------|------------------|
| | | ピクサム-G : オキシジェンタ |
| 3~8レベルの薬剤 | 6%または3% | 1 : 1 |
| 9~11レベルの薬剤 | 6%または3% | 1 : 2 |

※ピクサム-Gにはイゴラ オキシジェンタをお使いください。

薬剤の塗布

- グレイヘアの気になる部分から塗布します。

放置時間

- 標準放置時間は30分。髪質・塗布の部位によって調節します。

カラーチェック

- 部分的に薬剤を拭き取り、染毛効果を確認します。

乳化・シャンプー

- 乳化・プレーンリンス後、サロンオンリーシャンプー／カラーセーブ シャンプー(またはカラーズペシフィック)で洗い流します。

アフタートリートメント

- カラーセーブ トリートメント(またはカラーズペシフィック)で、カラー直後のアフタートリートメントをします。

使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。
ご使用前には毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。